

ВАЛЕЖНИК И МИКРОСУКЦЕССИИ В ЕЛЬНИКЕ ВЫСОКОТРАВНОМ НА НИЗИННОМ БОЛОТЕ (БРЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)

О. И. Евстигнеев

Заповедник «Брянский лес»,
Россия, 242180, Брянская область, станция Нерусса
E-mail: quercus_eo@mail.ru

М. В. Горнова

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Россия, 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
E-mail: mariya_harlampieva@mail.ru

Л. Н. Анищенко

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Россия, 241036, г. Брянск
E-mail: lanishchenko@mail.ru

FALLEN LOGS AND MICROSUCCESSION IN THE TALL HERB SPRUCE FOREST IN THE LOWLAND SWAMP (BRYANSK POLESIE)

O. I. Evstigneev

State Nature Reserve "Bryanskii Les", Nerussa Station, Bryansk Oblast, 242180, Russia
E-mail: quercus_eo@mail.ru

M. V. Gornova

Center for Problems of Ecology and Productivity of Forest, Russian Academy of Sciences (RAS),
84/32 Profsoyuznaya street, Moscow, 117997, Russia
E-mail: mariya_harlampieva@mail.ru

L. N. Anishchenko

Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky,
Bryansk, 241036, Russia
E-mail: lanishchenko@mail.ru

Аннотация. Исследование проводили в высокотравном ельнике на низинном болоте с доминированием *Picea abies* (Брянская область, Россия). Проанализированы показатели видового разнообразия (видовое богатство, видовая насыщенность и др.) микрогруппировок растений на валежинах разной степени разложения. Эту последовательность микрогруппировок рассматривали как микросукцессию. Виды мохообразных господствуют на первых стадиях микросукцессий, а виды сосудистых растений – на промежуточных и конечных. Показано, что микросукцессии на валежнике способствуют поддержанию видового разнообразия травяного и мохового покрова в ельниках высокотравных на низинных болотах.

Ключевые слова: валежник, микрогруппировки растений, микросукцессии растений, ельник высокотравный, низинное болото, Брянское полесье.

Abstract. Studies were carried out in the tall herb spruce forest in the lowland swamp with domination of *Picea abies* (the Bryansk region, the Russian Federation). The indicators of species diversity (species richness, species density and other) of plant microcommunities on fallen logs (deadwood) with different degree of wood decomposition have been analyzed. We considered this sequence of plant microcommunities as microsuccession. Bryophyte species dominated on the first stages of microsuccession, and vascular plant species prevailed on intermediate and final stages. It is shown that microsuccession on fallen logs contributes to the maintenance of the species diversity of the herb and moss cover in the tall herb spruce forests in the lowland swamp.

Key words: fallen log, deadwood, plant microcommunity, plant microsuccession, tall herb spruce forest, lowland swamp, Bryansk Polesie.